



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

17.03.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медикаментов для нужд учреждения в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 24 марта 2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	Международное непатентованное наименование	Основные характеристики: форма выпуска, фасовка, показания к применению	Ед. изм	Кол-во
1	Водорода пероксид	Раствор для местного и наружного применения 3%, 100 мл - бутылки полимерные с капельницей (1). Состав: активное вещество водорода пероксид. Показания: воспалительные заболевания слизистых, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения. Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	34
2	Хлоргексидин	Раствор для местного и наружного применения 0,05%, 100 мл, - флакон-капельницы полимерные (1) - пачки картонные. Состав: хлоргексидина биглюконат 0,5 г. Показания: обеззараживание кожных покровов (потертости, трещины), гнойные раны, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек в хирургии, урологии, акушерстве и гинекологии, стоматологии (гингивит, стоматит, афты, пародонтит, альвеолит), профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес – применение не позднее 2ч после полового акта). Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	27
3	Натрия хлорид	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл - самоспадающийся полиэтиленовый флакон (не содержащий ПВХ), занимающий устойчивое вертикальное положение, с двумя отдельными стерильными портами, запечатанными фольгой, при вскрытии одного порта сохраняется стерильность другого (10) - коробки картонные. Состав: 1000 мл содержат в качестве активного вещества натрия хлорид 9 г. Показания: большие потери внеклеточной жидкости или недостаточное ее поступление (токсическая диспепсия, холера, диарея, «неукротимая» рвота, обширные ожоги с сильной экссудацией и другие состояния), гипохлоремия и гипонатриемия с обезвоживанием, кишечная непроходимость, интоксикации. Наличие возможности	уп	34

		контроля оставшегося количества жидкости на любом этапе инфузионной терапии, во флакон возможно добавить дополнительный объём жидкости не менее 50 мл. Срок годности не менее 3-х лет.		
4	Бриллиантовый зеленый	Раствор для наружного применения спиртовой 1%, 10 мл - флаконы темного стекла (1). Состав: 100 мл содержат в качестве активного вещества бриллиантовый зеленый 1 г. Показания: свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит, блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов. Условия хранения: при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	19
5	Лидокаин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2мл, - ампулы (5) / в комплекте с ножом ампульным или скарификатором / - контурные ячейковые упаковки (2) - пачки картонные. Состав: 1 мл содержит в качестве активного вещества лидокаина гидрохлорид 20 мг. Показания: местная и региональная анестезия, проводниковая анестезия при больших и малых хирургических вмешательствах. Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	40
6	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г - флаконы (1) - пачки картонные. Состав: 1 флакон содержит в качестве активного вещества цефтриаксон 1г. Показания: бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к цефтриаксону возбудителями: инфекции органов брюшной полости (перитонит, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, в т.ч. холангит, эмпиема желчного пузыря); заболевания верхних и нижних дыхательных путей (в т.ч. пневмония, абсцесс легких, эмпиема плевры); инфекции костей, суставов, кожи и мягких тканей; инфекции урогенитальной зоны (в т.ч. гонорея, пиелонефрит); бактериальный менингит и эндокардит, сепсис; инфицированные раны и ожоги; мягкий шанкр и сифилис; болезнь Лайма (боррелиоз); брюшной тиф; сальмонеллез и сальмонеллезное носительство; профилактика послеоперационных инфекций; инфекционные заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом. Свежеприготовленные растворы цефтриаксона физически и химически стабильны в течение 6 ч при комнатной температуре. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности не менее 3-х лет.	уп	500
7	Метамизол натрия	Раствор для инъекций 500 мг/мл, 2 мл - ампулы (10) - пачки картонные. Состав: 1 мл раствора содержит в качестве активного вещества метамизол натрия 500 мг. Показания к применению: Болевой синдром различной этиологии (острый и хронический): в т.ч. головная, мигренозная боль, зубная боль, невралгия, миалгия, корешковый синдром, альгодисменорея; при почечной, печеночной и желчной коликах (в комбинации со спазмолитическими средствами); Уменьшение болей после хирургических и диагностических вмешательств. Повышенная температура тела при «простудных» и других инфекционно-воспалительных заболеваниях. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте. Срок годности не менее 3-х лет.	уп	40
8	Этамзилат	Раствор для инъекций, 125 мг/мл, 2 мл- ампулы (5) - контурная ячейковая упаковка (2) - пачка картонная. Состав: 1 мл содержит в качестве активного вещества этамзилат 125 мг. Показания: профилактика и остановка кровотечений: паренхиматозные и капиллярные кровотечения (в т.ч. травматическое,	уп	10

		в хирургии при операциях на сильно васкуляризированных органах и тканях, при оперативных вмешательствах в стоматологической, урологической, офтальмологической, отоларингологической практике, кишечное, почечное, легочное кровотечения, метро- и меноррагии при фибромиоме и др.), вторичные кровотечения на фоне тромбоцитопении и тромбоцитопатии, гипокоагуляция, гематурия, внутричерепное кровоизлияние (в т.ч. у новорожденных и недоношенных детей); носовые кровотечения на фоне артериальной гипертензии, кровотечения, обусловленные приемом лекарственных средств, геморрагический диатез (в т.ч. болезнь Верльгофа, Виллебранда-Юргенса, тромбоцитопатия), диабетическая микроангиопатия (геморрагическая диабетическая ретинопатия, повторное кровоизлияние в сетчатку, гемофтальм). Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 3-х лет.		
9	Трамадол	Раствор для инъекций 50 мг/мл, 2 мл - ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные. Состав: 1 мл содержит в качестве активного вещества трамадола гидрохлорид 50 мг. Показания: умеренный и сильный болевой синдром различной этиологии (послеоперационный период, травмы, боли у онкологического больных, при диагностических или лечебных манипуляциях). Условия хранения: при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 5 лет.	уп	5
10	Атропин	Раствор для инъекций 0,1%, 1 мл - ампулы (10) /в комплекте с ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным/ - коробки картонные. Состав: 1 мл раствора содержит в качестве активного вещества атропина сульфат 1 мг. Показания: Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, пилороспазм, спазмы кишечника, желчного пузыря и желчных протоков, мочевыводящих путей, бронхов, ларингоспазм (профилактика); гиперсаливация (паркинсонизм, отравление солями тяжелых металлов); брадикардия, АВ-блокада; отравления холиномиметическими и антихолинэстеразными средствами; премедикация перед хирургическими операциями. Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре до 300С. Срок годности не менее 5 лет.	уп	4
11	Тиопентал натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г, 20 мл - флаконы (1) - пачки картонные. Состав: в качестве активного вещества тиопентал натрия 1 г. Показания: общая анестезия при кратковременных хирургических вмешательствах, вводная и базисная общая анестезия (с последующим использованием анальгетиков и миорелаксантов). Большие эпилептические припадки (grand mal), эпилептический статус, повышение внутричерепного давления, профилактика гипоксии мозга (при искусственном кровообращении, каротидной энтерэктомии, нейрохирургических операциях на сосудах головного мозга), наркоанализ и наркосинтез в психиатрии. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	22
12	Дексаметазон	Раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные. Состав: 1 мл содержит в качестве активного вещества дексаметазон 4 мг. Показания: применяется внутривенно или внутримышечно в острых случаях или при невозможности проведения пероральной терапии: эндокринные заболевания: острая недостаточность коры надпочечников, первичная или вторичная недостаточность коры	уп	3

		надпочечников, врожденная гиперплазия коры надпочечников, подострый тиреоидит; шок (ожоговый, травматический, операционный, токсический) – при неэффективности сосудосуживающих средств, плазмозамещающих препаратов и другой симптоматической терапии; отек головного мозга (опухоли головного мозга, черепно-мозговая травма, нейрохирургическое вмешательство, кровоизлияние в мозг, энцефалит, менингит, лучевое поражение); астматический статус, тяжелый бронхоспазм (обострение бронхиальной астмы, хронического обструктивного бронхита); тяжелые аллергические реакции, анафилактический шок; ревматические заболевания; системные заболевания соединительной ткани; острые тяжелые дерматозы; злокачественные заболевания: паллиативное лечение лейкоза и лимфомы у взрослых пациентов, острая лейкемия у детей, гиперкальциемия у пациентов, страдающих злокачественными опухолями, при невозможности перорального лечения; заболевания крови: острые гемолитические анемии, агранулоцитоз, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых; тяжелые инфекционные заболевания (в сочетании с антибиотиками); офтальмология (субконъюнктивальное, ретробульбарное или парабульбарное введение): аллергический конъюнктивит, кератит, кератоконъюнктивит без повреждения эпителия, ирит, иридоциклит, блефарит, блефароконъюнктивит, склерит, эписклерит, воспалительный процесс после травм глаза и оперативных вмешательств, симпатическая офтальмия, иммуносупрессивное лечение после трансплантации роговицы; локальное применение (в область патологического образования): келоиды, дискоидная красная волчанка, кольцевидная гранулема. Условия хранения: при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 5 лет.		
13	Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]	Раствор для инфузий, 500мл, - флакон (10) - коробки картонные. Состав: 1 л содержит в качестве активных веществ натрия хлорид 8,6 г, калия хлорид 0,3 г, кальция хлорида гексагидрат 0,25 г. Показания: дегидратация и нарушение электролитного баланса (при термических ожогах тяжелой 3 и 4 степени, обморожениях, длительной рвоте и диарее), острая кровопотеря, коррекция водно-солевого баланса при остром разлитом перитоните и кишечной непроходимости, кишечный свищ, острая кишечная инфекция, гиповолемический шок, лечебный плазмаферез. Для разведения концентрированных электролитных растворов. Условия хранения: при температуре не выше 250С. Срок годности не менее 2-х лет.	уп	40
14	Ропивакаин	Раствор для инъекций 10 мг/мл, 10 мл - ампулы полипропиленовые - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные. Состав: 1 мл содержит в качестве активного вещества ропивакаина гидрохлорид моногидрат, соответствующий 7,5 мг ропивакаина гидрохлорида. Показания: Анестезия при хирургических вмешательствах: эпидуральная блокада при хирургических вмешательствах, включая кесарево сечение; блокада крупных нервов и нервных сплетений; блокада отдельных нервов и инфильтрационная анестезия. Купирование острого болевого синдрома: продленная эпидуральная инфузия или периодическое болюсное введение, например, для устранения послеоперационной боли или обезболивания родов; блокада отдельных нервов и инфильтрационная анестезия; продленная блокада периферических нервов; внутрисуставная инъекция. Купирование острого болевого синдрома в педиатрии: каудальная эпидуральная блокада у новорожденных и детей до 12 летнего возраста включительно; продленная эпидуральная инфузия у новорожденных и детей до 12 летнего возраста включительно. Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, известная повышенная чувствительность к	уп	5

		местным анестетикам амидного типа. Условия хранения: при температуре не выше 300С. Срок годности не менее 3-х лет.		
15	Баклофен	Раствор для интраткального введения 0.5 мг/мл, 20 мл - ампулы (1) - пачки картонные. Состав: 1 ампула содержит в качестве активного вещества баклофен 0,5 мг. Показания: выраженная хроническая спастичность при поражении спинного (например, вследствие травмы, при рассеянном склерозе) или головного мозга при неэффективности или непереносимости терапии миорелаксантами для приема внутрь. Условия хранения: при температуре не выше 30°С. Срок годности не менее 3-х лет.	уп	21

Заместитель директора по ОВ

А. В. Лыженков