



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

26.05.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку дезинфицирующих средств для нужд учреждения в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 05 июня 2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

1	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом	Сфера применения: - мытье рук перед обработкой кожными антисептиками, - гигиеническая обработка рук, - санитарная обработка кожных покровов. Средство представляет собой однородную густую, готовую к применению бесцветную жидкость без запаха. Средство содержит лауретсульфат натрия, эфиры жирных кислот кокосового масла, натрия хлорид, лимонную кислоту и другие функциональные добавки. рН средства 6 - 7. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает выраженными моющими свойствами, а также антибактериальным эффектом. Не сушит кожу рук и тела, гипоаллергенно. Не содержит красителей и ароматизаторов. Упаковка: - флакон не менее 1 литра с дозирующей насадкой.	флак	50
2	Средство для быстрой дезинфекции	Средство для быстрой дезинфекции Сфера применения: - дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики УЗИ, бактерицидные лампы, - дезинфекция перчаток, надетых на руки персонала. Средство применяется в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, включая операционные отделения, отделения реанимации, перевязочные, стоматологические кабинеты. Средство содержит в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт - не менее 65%, ЧАС – не более 0,03%, а также функциональные компоненты. Средство не содержит альдегидов, аминов, гуанидинов. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 - 4 класс при нанесении на кожу и при введении в желудок. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает бактерицидным (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций, (в т.ч. возбудителей туберкулеза – тестировано на M.tetragae)), фунгицидным (в том числе в отношении дрожжевых грибов, трихофитий) и вирулицидным	флакон	150

		действием (в том числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов). Режимы применения средства: Дезинфекция гладких поверхностей: - бактериальный и вирусный режим: экспозиция не более 0,5 мин Расход средства – не более 50мл на 1м2 Упаковка – флакон с распылителем не менее 1 литра		
3	Кожный антисептик	Кожный антисептик Сфера применения: - обработка кожи операционных полей, - обработка кожи инъекционных полей методами протирания и орошения, - обработка кожи перед введением катетеров, - обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала. Готовый к применению неокрашенный раствор, содержащий в качестве действующих веществ изопропиловый и пропиловый спирт суммарно не менее 70%, хлоргексидина биглюконат – не менее 0,5%, а также функциональные добавки и обезжиривающие компоненты. Не содержит ЧАС, производных фенола, гуанидина. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс при введении в желудок и нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, внутрибольничные инфекции), вирусов (включая вирусы полиомиелита), патогенных грибов. Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 5 часов. Режимы применения средства: Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров: двукратное протирание ватным тампонами, обильно смоченными средством, экспозиция не более 1 мин. Обработка кожи инъекционного поля методами протирания и орошения: экспозиция не более 30 сек Обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки персонала: экспозиция не более 3 мин. Упаковка: - флакон не менее 1 литра с дозирующей насадкой.	флакон	50
4	Кожный антисептик	Сфера применения: - обработка рук хирургов, - гигиеническая обработка рук, - обработка кожи инъекционных полей методами протирания и орошения, - для обеззараживания медицинских перчаток (из латекса, неопрена, ниприла др. материалов), надетых на руки медицинского персонала при загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. Готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующих веществ изопропиловый спирт и пропиловый спирт суммарно не менее 70%, хлоргексидина биглюконат – не более 0,5%, а также функциональные добавки и увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Средство не содержит ЧАС, производных фенола, гуанидина. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс при введении в желудок и нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает антимикробной активностью в отношении	флакон	60

		грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, внутрибольничные инфекции), вирусов (включая вирусы полиомиелита), патогенных грибов. Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 5 часов. Режимы применения средства: Обработка рук хирургов: двукратная обработка по 3 мл в течении 1,5 мин. Гигиеническая обработка рук: расход не более 3 мл, экспозиция – не более 30 сек Обработка кожи инъекционного поля методами протирания и орошения: экспозиция не более 20 сек Обработка перчаток, надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (не более 3 мл на тампон), или распылить средство до полного их смачивания, дезинфекционная экспозиция не более 3 мин. Упаковка: - флакон не менее 1 литра в диспенсопаке.		
5	Кожный антисептик	Кожный антисептик Сфера применения: - обеззараживание и обезжиривание операционного поля с обозначением границ обработки. Средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета. Средство содержит в качестве действующих веществ: изопропанол - не более 45%, гуанидин - не более 0,25%, а также функциональные добавки, в том числе пищевой краситель группы флавоноидов и воду питьевую деионизированную. Средство не содержит ЧАС, производных фенола.. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс при введении в желудок и нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей туберкулёза и внутрибольничных инфекций (ВБИ), патогенных грибов - возбудителей дерматофитий и кандидозов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, ВИЧ, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа и др.). Средство обладает пролонгированным эффектом не менее 3 часов. Режимы применения средства: Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров: время выдержки после окончания обработки не более 2 мин Упаковка - флакон не менее 1 литра.		10
6	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом (кожный антисептик)	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом (кожный антисептик) Сфера применения: - гигиеническая обработка рук перед и после проведения медицинских манипуляций; - для мытья рук перед гигиенической и хирургической дезинфекцией рук; - санитарная обработка кожных покровов для мытья пациентов в ванне и под душем. Препарат должен быть применим для чувствительной кожи. Жидкое мыло – кожный антисептик, должно представлять собой готовое к применению жидкое средство гелеобразной консистенции, без запаха, содержащее ухаживающие, увлажняющие и		100

		защищающие вещества. Средство содержит молочную кислоту, кокамид, лаурилсульфат натрия, кокоамидопропиловый бетаин. Ph – 5-6. Средство в своем составе не должно содержать четвертичных аммониевых соединений (ЧАСов), производных фенола, третичных аминов, гуанидинов, красителей и ароматизаторов натурального и/или искусственного происхождения, экстрактов трав. Средство должно легко смываться с кожи. Средство не должно обладать кожно-резорбтивными свойствами, свойствами сенсibilизации. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс при введении в желудок и нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает антибактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) бактерий, фунгицидной активностью в отношении дрожжеподобных грибов. Режимы применения средства: Гигиеническая обработка рук мед. персонала, санитарная обработка кожных покровов пациентов не более 3 мл: - при экспозиции не более 1 мин. Мытье рук хирургов: - расход не более 3 мл двукратно. Общее время обработки не более 2 мин. Упаковка: - флакон не менее 1 литра в диспенсопаке с вакуумной системой дозации. Средство должно иметь свидетельство государственной регистрации в качестве жидкого мыла с антибактериальным эффектом (кожного антисептика) и инструкцию по применению.		
7	Средство для дезинфекции с моющим эффектом	Сфера применения: - дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, лабораторной и столовой посуды, - дезинфекция и мытье мусороуборочного оборудования и мусоросборников, - дезинфекция медицинских отходов, - дезинфекция воздушных фильтров, радиаторных решеток, насадок, накопителей конденсата систем вентиляции и кондиционирования, - дезинфекция внешних и внутренних систем водоснабжения, искусственных водных резервуаров (душевые установки, бассейны, ванны для бальнеопроцедур). Средство представляет собой таблетки круглой формы, с плоской поверхностью и с крестообразной фаской-риской для удобства деления таблетки, с целью получения небольших объемов дезинфицирующих растворов. Средство содержит в качестве действующего вещества: натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, а также ПАВ и специальные компоненты. При растворении 1 таблетки в воде выделяется не менее 1,48 г активного хлора. Для получения моющего эффекта не требуется добавление синтетических моющих средств (стиральных порошков и т.п.). Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 - 3 класс при введении в желудок, 4 класс при нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Срок годности рабочих растворов не менее 5 суток. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза -тестировано на M.Terraе), возбудителей легионеллеза, внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки,		40

		ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы). Должны обладать способностью деконтаминировать объекты, контаминированные ампликонами ДНК/РНК. Возможность экспресс-контроля концентрации рабочего раствора средства с помощью тест-полосок Режимы применения средства: Дезинфекция поверхностей в помещениях: бактериальный режим - расход не более 1 таблетки на 20 литров воды при экспозиции не более 30 мин - расход не более 2 таблеток на 20 литров воды при экспозиции не более 15 мин вирусный режим - расход не более 1 таблетки на 20 литров воды при экспозиции не более 60 мин - расход не более 2 таблеток на 20 литров воды при экспозиции не более 30 мин Дезинфекция столовой посуды без остатков пищи по бактериальному режиму: - расход не более 1 таблетки на 20 литров воды при экспозиции не более 15 мин (возможность многократного использования рабочих растворов средства для дезинфекции посуды) Дезинфекция медицинских отходов класса Б: изделия однократного применения - расход не более 2 таблеток на 10 литров воды при экспозиции не более 60 мин перевязочные средства - расход не более 5 таблеток на 10 литров воды при экспозиции не более 60 мин Упаковка: - полимерная банка не менее 300 таблеток.		
--	--	--	--	--

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков